

PATIO 巨无霸非洲菊

总论:

灌溉

灌溉时间: 清晨。夜幕降临时, 植物应干燥, 避免根部问题。

生长调节剂

我们的任何苗木都不必要使用植物生长调节剂。

移栽

幼苗移植到至少有6个排水孔的19-25cm的花盆中。

盆径& 花径



零售建议

我们建议零售阶段至少有3朵花蕾开放。

移栽后的时间表, 依气候情况而定:

夏季	12-16周
冬季	16-20周

幼苗移栽到花盆中

移栽基质

- 使用干净排水良好的基质
 - pH 5.5 - 5.8
 - EC 1.0 - 1.5
- 注意pH值, 如果pH值太高, 植株叶片会失绿。

花盆

幼苗可移栽到19-25cm的花盆中。将植物移栽到花盆的中间, 用基质填平。移栽后的植物花盆可放置紧密些, 以形成最佳的微气候。

最佳气候

	温室温度	湿度	光照
1-3周	18-20°C / 64-68°F 白天 & 夜晚	< 80%	300 Watt/m ² (20.000 Lux / 1.850 ft*c)
4-6周	18-20°C / 64-68°F 白天 & 夜晚	< 80%	400-500 Watt/m ² (35.000-45.000 Lux / 3.250-4.200 ft*c)
7-12周	白天 : 18-19°C / 64-66°F 夜晚 : 15-16°C / 59-61°F	< 80%	500-600 Watt/m ² (45.000-55.000 Lux / 4.200-5.100 ft*c)

在夜晚温度下降能使植物长出一些芽。在冬天的晚上人工照明能保持产品质量。增加5.500 勒克斯光照以确保最佳的光照水平。

灌溉

从上面灌溉以加强根系发育。当植物的根系长满花盆时, 从下面灌溉是最理想的, 无论是喷灌还是滴灌。

移栽后的水肥组合- 营养生长期: 1 - 8周:

Ec.	pH.	NH ₄	K	Ca	Mg	NO ₃	CL	SO ₄	H ₂ PO	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo	
		mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	umol	umol	umol	umol	umol	umol	
1.5 - 2.0	5.8	0-0.1	5	4.7	1.8	10.5	1.7	2	1.8	40	5	5	35	1	1	
		↑ 依据pH和水质														

移栽后的水肥组合- 生殖生长期: 8周及以上

Ec.	pH.	NH ₄	K	Ca	Mg	NO ₃	CL	SO ₄	H ₂ PO	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo	
		mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	mmol	umol	umol	umol	umol	umol	umol	
2.0 - 2.8	5.8	0-0.1	5.4	5.3	2	9.5	2.7	3	1.8	40	5	5	35	1	1	
		↑ 依据pH和水质														

或者使用之前准备好的基础肥料，如：18-9-18或17-5-17，并添加完整的微量元素

盆距调整

一旦植物彼此接触，就可以拉大盆距，这大约是在移栽后6-8周。

平均盆径：19 cm

- 移栽： 每平米24盆时
- 调整盆距： 每平米8盆时

修剪植株

移栽6-10周后，第一朵花就会出现。掐掉第一个芽以刺激植株产生更多的花蕾，能一起大量开花。



大汉网站



微信号dahant

常见问题

非洲菊栽培上最常见的问题和解决方案：

潜叶蝇

印楝素；灭蝇胺；阿维菌素。

白粉虱

麦芽糊精；印楝素；溴氰菊酯。

蓟马

印楝素；阿维菌素；溴氰菊酯。

灰霉病

控制湿度；咯菌腈 + 啞菌环胺； 异菌脉。

白粉病

氟吡菌酰胺。

螨虫

苯丁锡或阿维菌素

蚜虫

抗蚜威；啞虫脒；除虫菊酯。

腐霉属 / 疫霉属

咪唑菌酮+三乙磷酸铝；控制浇水，基质不能太湿，要有良好的排水性；早晨浇水。



注：本手册中的栽培指导基于北欧气候。种植者可以这些准则作为参考。植物生长的时间可能因气候、地点、时间和温室环境条件而有所不同。

如需技术指导，请联系大汉公司！

服务专线：400662330
 集团信箱：info@dahant.com
 集团网址：www.dahant.com.cn
 服务据点：北京、山东、上海、广州、成都、昆明、海南、福建、台北