

Patio 巨无霸非洲菊栽培手册



一、基质

移栽基质

使用排水良好、粗糙的基质，便于成功生根。

PH: 5.5-5.8 EC: 1.0-1.5

注意监测 PH，PH 过高会导致叶片褪绿。

二、盆器

幼苗应该移栽到 6-15 厘米的盆器中。将幼苗移植在盆器的中间，用基质填平。使用至少有 6 个排水孔和 1 个口的盆器。移栽后的盆器可放置紧密些，以形成最佳的微气候。

三、盆距

一旦植物彼此接触，就可以拉大盆距，这大约是在移栽后 6-8 周。

平均盆径：19cm

移栽时：每平米 24 盆

疏盆后：每平米 8 盆

四、灌溉

从上面灌溉开始（为了增强根系发育）。当花芽出现时，减少水流或滴灌是最好的。

灌溉时间：早上。

浇水：更喜欢中等干燥的土壤条件。

五、施肥建议（单位 ppm）

PH	NH ₄	K	Ca	Mg	NO ₃	Cl	SO ₄	P	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo
5.7	9	196	188	44	682	60	192	56	2.24	0.27	0.33	0.38	0.06	0.1

注：NH₄ 含量取决于 PH 和水的质量

EC:

刚开始 1-6 周 1.5-2

开花阶段：2.0-2.8

或使用一个基本的 NKP 肥料，比如含有微量元素的 18-9-18 或 17-5-17

六、最佳气候

周	温度	相对湿度	光照
1-3	白天和晚上 18°C-20°C	<80%	30000lux
4-6	白天和晚上 18-20°C	<80%	40000 -50000lux
7-12	白天： 18-19°C 夜晚： 15-16°C	<80%	50000-60000 lux

七、收获

移栽后 6-10 周第一朵花就会出现。摘掉第一个花芽以促进植物产生更多的花芽，在销售的时候大量开放。

零售建议：

我们建议在零售阶段至少有3朵花蕾开放。移栽后的时间表，依气候情况和盆器尺寸而定。

夏季：12-16周

冬季：16-20周

服务专线：400 662 3330
集团信箱：info@dahant.com
集团网站：www.dahant.com.cn



总论：

- 1、灌溉管理是关键。过度浇水是低质量和高作物损失的一个常见的原因。
- 2、没必要使用植物生长调节剂。
- 3、常见病虫害：潜叶蝇、白粉虱、蓟马、灰霉病、白粉病、螨虫、蚜虫、腐霉属。
- 4、不同客户的种植建议具体跟环境有关，请根据实际情况进行调整。

服务专线：400 662 3330
集团信箱：info@dahant.com
集团网站：www.dahant.com.cn



微信号：dahant



集团网站