

Sundayz 三德士非洲菊系列 栽培手册

一、基质

1、育苗基质：

非洲菊播种时，使用通风、排水良好、湿润的基质。

PH: 5.5-5.8 EC: 0.7-1.0

建议加入 15%的珍珠岩。

2、移栽基质

使用排水良好的基质。

PH: 5.5-5.8 EC: 1.0-1.2

建议加入 20%的珍珠岩。



二、盆器（播种&移栽）

播种花舞士非洲菊在纸托盘中（托盘尺寸：128-144 孔），用粗糙的基质便于发芽和生根。

播种后 6 周进行幼苗的移栽。幼苗应该移栽到 6-15 厘米的盆器中。将幼苗移植在盆器的中间，用基质填平。使用至少有 4 个排水孔和 1 个口的盆器。

移栽后的盆器可放置紧密些，以形成最佳的微气候。

三、盆距

为了防止叶子伸展，我们建议在移栽 3 周后或当叶子接触时，把盆器间隔开。

盆器规格	10cm (m ²)	12cm (m ²)	15cm (m ²)
栽培密度	100	69	43
疏盆之后	33	23	15

四、灌溉

从上面灌溉开始（为了增强根系发育）。当花芽出现时，减少水流或滴灌是最好的。

灌溉时间：早上。当夜晚降临时，植物应该是干的，避免真菌感染和根部问题。

浇水：在发芽阶段（4-6 天时）保持土壤湿润。发芽之后非洲菊更喜欢中等干燥的土壤条件。

五、施肥建议（单位 ppm）

EC	PH	NH ₄	K	Ca	Mg	NO ₃	Cl	SO ₄	P	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo
1.8-2.5	5.7	9	196	188	44	682	60	192	56	2.24	0.27	0.33	0.38	0.06	0.1

注：NH₄ 含量取决于 PH 和水的质量

或使用一个基本的 NKP 肥料，比如含有微量元素的 18-9-18 或 17-5-17

六、最佳气候

周	温度	相对湿度	光照
播种（1-6）	24℃→19℃	99→75%	20000→45000lux
移栽（1-4）	19-20℃	80%	35000 lux
营养生长（5-8）	17-19℃	75%	45000 lux
开花（9-11）	12-17℃	70%	45000-54000lux

七、收获

零售建议

移栽后的时间表依据环境条件和盆器大小：

	盆器	夏季	冬季
大型	12-15cm	8-9 周	9-11 周
中型	10-13cm	8-9 周	9-11 周
小型	9-12cm	7-8 周	8-10 周
迷你	6-10cm	7-8 周	8-10 周

总论：

- 1、灌溉管理是关键。过度浇水是低质量和高作物损失的一个常见的原因。
- 2、没必要使用植物生长调节剂。
- 3、常见病虫害：潜叶蝇、白粉虱、蓟马、灰霉病、白粉病、螨虫、蚜虫、腐霉属。
- 4、不同客户的种植建议具体跟环境有关，请根据实际情况进行调整。