

倒挂金钟--Bella

倒挂金钟 Bella 的生长描述

倒挂金钟 Bella 与传统的倒挂金钟品种相比主要差异是什么？

--生长调节剂的使用减少了 50%

--缩短照明时间（14 小时而不是 16 小时）

土壤

使用轻质、优质的盆栽土壤。标准的比例是 50%园林泥炭和 50%泥炭苔。当你使用潮起潮落滴灌法时应该增加 10%珍珠岩。肥料：1-1.5kg.P.G 混合。

温度

起始温度 $\pm 17^{\circ}\text{C}$ 。打顶后可以使用温差控制技术，即高夜间温度 $\pm 17^{\circ}\text{C}$ 和低日温度 $\pm 13^{\circ}\text{C}$ 。这样的温度会导致较少的细胞拉伸，导致植物更加紧凑。平均日温度应该 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ 。平均温度过低会导致开花推迟。

摘心

在一般的倒挂金钟生长过程中我们建议在 3-5 对叶片时摘心，这取决于每平方米植物数量和盆器大小。因为倒挂金钟 Bella 的紧凑株型在 3 对叶片时摘心会太低。大于 12cm 的盆器我们建议在 4-5 对

叶片时摘心。深度摘心可以使株型丰满。

光照

从日历周一开始就应该额外补光。将每天延长至 14 小时，每平方米至少使用 15 瓦。我们建议在夜幕降临时光照。例如：10 个小时的日光。从晚上 11 点到凌晨 3 点照明。复照明也是可能的（每半小时 6 分钟）。从你开始照明后，预计 9-10 周开花。你可以从植物上盆后马上开始补光。倒挂金钟 **Bella** 不同品种的开花期不同。在我们的目录里查一下每个品种的开花期。

肥料

一旦植物根发育完全，每次浇水的时候都应该施肥；75%硝酸钾和 25%的硫酸镁混合 EC 为 2-2.5。在生长期偶尔使用复合肥料轮换，例如 20-20-20。

生长调控

倒挂金钟 **Bella** 是紧凑株型。每个品种的紧凑度不同（在目录里面查）。我们建议具有相同生长特性的品种放置在一起。使用温度控制技术和最干旱的可能条件，可以有效的控制生长。也可以使用以下生长调节剂组合：

组合 1:

- 矮壮素（750 克/升）：每 100 升水加 80-100 毫升
- 丁酰肼：每 100 升水加 200 克

组合 2:

- Prolong/Elasto : 每100升水加100毫升
- 矮壮素（750 克/升）：每 100 升水加 50 毫升
- 丁酰肼：每 100 升水加 125 克

使用 Prolong/Elasto 或另一种矮壮素和丁酰肼的剂量水流大小应该改变。这样的水流能使调节剂更好的分布在植株上。

注意：倒挂金钟 Bella 紧凑型的品种（见目录表格）的生长可通过生长调节剂停滞。只有当植株有合适尺寸时才使用这些生长调节剂。

建议：浇水后使用生长调节剂。切勿在浇水时加入生长调节剂。

植物保护

倒挂金钟容易感染灰霉病，会造成严重损失。为了防止这种情况你应该及时通风，保持相对湿度低于 80%。化学药剂预防可以使用：异菌

脲、戴唑霉、福美双。

吡丙醚、氟啶虫酰胺、吡蚜酮、溴氰菊酯、印楝素、扑虱灵都可以用来防治白粉虱。

氟啶虫酰胺、抗蚜威能用于防治虱子。

阿维菌素和灭虫威防治蓟马。

注意：使用以上药剂时请检查这些在你的国家是否允许。Hendriks Young Plants 对使用国家级禁止的药剂不负责。